

Point presse Covid 19

Polynésie française

Bureau de surveillance




25 novembre 2022

Hausse de l'incidence, du taux de positivité des tests et des hospitalisations pour Covid - Circulation exclusive du variant BA.5 et majoritaire de BQ1.1


Indicateurs	S45/22	S46/22	Tend ^{ce}
Nombre de nouveaux cas dans la semaine	57	102	↗
Taux d'incidence pour 100k personnes/7 jours	20	36	↗
Nombre total de tests dans la semaine	262	274	↗
Taux de positivité global	21,8%	37,2%	↗
Taux de dépistage pour 100k personnes/7 jours	94	98	↗
Hospitalisations en cours pour Covid	2	5	↗
Dont nombre d'hospitalisations en cours pour Covid en réanimation	1	1	→
Nombre de décès dans la semaine	0	0	→
Nombre de doses injectées par semaine	374	481	↗
Part de la population ≥ 60 ans avec dernière dose dans les 6 mois	19,4*	22,1%	↗
Part de la population ≥ 80 ans avec dernière dose dans les 6 mois	24,1*	26,1%	↗



Diffusion sur l'ensemble du territoire mais incidences plus hautes aux IDV, ISLV et Australes




Vagues de moins en moins fortes, mais décès toujours possibles. Efficacité des campagnes vaccinales antérieures : à poursuivre +++




Couvertures vaccinales

● 1 dose ● 2 doses ● 3 doses ● 4 doses


Population 18ans et plus




Population 60ans et plus



Population 80ans et plus



Situation dans le monde : nette diminution des cas et des décès, mais persistance de vagues récurrentes



Source: Johns Hopkins University CSSE COVID-19 Data

RECOMMANDATIONS ISOLEMENT EN CAS DE COVID (18/07/2022)



POSITIF COVID SYMPTOMATIQUE

Isolement pendant 5 jours

- Poursuivre l'isolement jusqu'à 7 jours si les symptômes persistent (sortie d'isolement après 48h sans symptômes)

- Si le dernier rappel vaccinal date de moins de 6 mois, possibilité de lever l'isolement dès 48h après la fin des symptômes

- Respect strict des mesures barrières* pendant 1 semaine après l'isolement.



POSITIF COVID ASYMPTOMATIQUE

Pas d'isolement recommandé sous réserve du respect strict des mesures barrières* pendant 1 semaine

- Dans tous les cas, informer son entourage proche et la collectivité (classe, garderie, colonie... pour les enfants)

- **SUJET CONTACT ETROIT** : Pas d'isolement nécessaire
Port du masque chirurgical ou "grand public" systématique

*MESURES BARRIÈRES

- Port du masque (dispensation de 50 masques chirurgicaux en pharmacie sur prescription médicale)
- Repas pris sans autre personne à proximité
- Aération des locaux (minimum pendant 10 minutes toutes les heures)
- Lavages des mains ou frictions par soluté hydro alcoolique fréquents (après repas, toilettes, en entrant et en sortant des lieux publics...)
- Limitation des interactions sociales et distanciation physique d'un mètre minimum
- Privilégier le télétravail
- Éviter les transports en commun, les lieux fréquentés et les lieux clos sans aération

Pour tout problème médical, consultez votre médecin traitant - En cas de difficultés respiratoires, d'essoufflement : appelez le 15

Site de la Direction de la santé : <https://www.service-public.pl/dsp/>